

ANTIBIÓTICOS

Orales




LABORATORIOS PIER
SOLUCIONES EN
MEDICINA VETERINARIA

LA
SOLUCIÓN
antibiótica
Oral EN EL AGUA DE BEBIDA
PARA SUS AVES Y CERDOS

ENROFLOX 20%

TRIMEFOS





ENROFLOX 20%

REGISTRO Q-0974-051

Oral
en agua de
bebida libre
de cloro.

Cada 1 ml contiene:

Enrofloxacin base
200 mg.

Vehículo c.b.p. 1 ml.



Presentaciones
comerciales:

20 L

1 L



Antimicoplásmico

y contra bacterias de cepas sensibles a la fórmula como *Haemophilus*, *Campylobacter*, *Salmonella*, *Proteus*, *Klebsiella*, *Pasteurella*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Escherichia coli*, *Gallibacterium anatis*, *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., en aves de todas las edades y cerdos.



Aves de engorda, de reemplazo, reproductoras y gallos de pelea de todas las edades.

Dosis terapéutica en aves:

10 mg de enrofloxacin/kg pv por día
durante 3 a 5 días consecutivos de
tratamiento. Oral en agua de bebida.



No administrarse 7 días antes del sacrificio de los animales para consumo humano. No se administre en aves productoras de huevo para plato.

Previene o resuelve
procesos infecciosos
causantes de diarreas y
enfermedades respiratorias.

Acción antibiótica
de amplio espectro que lo
vuelve un producto
CONVENIENTE.

Se
recomienda
para la medicación
vía oral en agua de bebida
libre de cloro.

A)

CALCULAR LA CANTIDAD

de Enroflox 20% Solución Oral necesaria para el total aproximado de kilos de aves a tratar.

B)

CALCULAR LA CANTIDAD

de agua consumida diariamente por la parvada a tratar.

C)

DILUIR EL TOTAL

de Enroflox 20% en el volumen de agua de bebida calculada diariamente por las aves.

D)

VERIFICAR QUE

los animales se consuman el total de agua medicada.

E)

MEDICAR DIARIAMENTE

el agua de bebida hasta completar el tratamiento.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA



TRIMEFOS

REGISTRO Q-0974-085



Cada 100 ml contiene:



Fosfomicina sódica 10 g

Trimetoprim 2.5 g

Vehículo c.b.p. 100 ml.

Oral
en agua de
bebida.


No superar
la dosis
recomendada.

No usar
en caso de
hipersensibilidad
conocida
a la fórmula o algún
excipiente.

Fuera del alcance
de los niños y de los
animales domésticos.

Mantengase
en un lugar fresco,
seco y protegido
de la luz solar
a no más de 25° C.

**Presentaciones
comerciales:**



En aves:

Colibacilosis. E.R.C.C. Enteritis, Salpingitis, Septicemia, Salmonelosis, Coriza Infecciosa, Cólera Aviar e infecciones causadas por *Staphylococcus* spp.

En porcinos: Colibacilosis, Diarreas Bacterianas, Bronconeumonía, Neumonía Enzoótica y el Complejo M.M.A.



En aves y cerdos:

Oral en agua de bebida: 1 a 2 ml por litro de agua de bebida de 3 a 5 días según la severidad del caso.
La dosis terapéutica es de 10 mg/kg de peso vivo.



No usar este producto 8 días antes del sacrificio de los animales destinados para el consumo humano. No consumir los huevos de las aves tratadas hasta 24 horas después del último tratamiento.



**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA**



ENROFLOX 20% TRIMEFOS



LABORATORIOS PIER
SOLUCIONES EN
MEDICINA VETERINARIA

La ingesta o consumo de agua diaria por animal dependerá de varios factores a considerar además del peso corporal, estado fisiológico y consumo de alimento propio de cada etapa zootécnica propia de la granja.

Disminuyen la ingesta de agua



Agua alta en minerales.



Temperatura alta del agua.



Estrés por baja en la temperatura ambiente.



Deficiencia en el flujo del agua en bebedero automático.

Aumentan la ingesta de agua



Estrés calórico por clima.



Aumento de proteína en la dieta.




Aumento de sales minerales en la dieta.




La calidad del agua (contenido de minerales).

DIAGNÓSTICO MOLECULAR POR TÉCNICA PCR (POLYMERASE CHAIN REACTION)



Para el análisis de diagnóstico en aves por PCR, las muestras pueden ser a partir de tejidos frescos, hisopos traqueales, hisopos cloacales, hisopos de arrastre, embrion picado no nacido, vacunas y cepas, que serán conservadas en refrigeración o congelación para evitar la degradación de RNA.



Las muestras en cerdos se enviarán en recipiente limpio, conservadas en refrigeración o congelación antes y durante su traslado inmediatamente posterior a la toma de muestras; sean hisopos, fluidos, exudados, tejidos, sueros, fetos, heces, esto debido a que hay agentes con RNA que puede degradarse si no son conservadas en las condiciones especificadas.



Hecho en México por:
LABORATORIOS PIER S.A. DE C.V.



Benito Juárez Norte No.100 C.P. 75855
San Lorenzo Teotipilco, Tehuacán, Puebla.



Tels.(238) 37 12 400, (800) 712 4333 y 505 4120



rjortega@laboratoriospier.com.mx